

Préparation magistrale remplaçant le Kardegic 75 mg®

Date de création
23 mars 2022

Version 1

Page 1 sur 2

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE CETTE PREPARATION ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Composition qualitative et quantitative

Acide acétylsalicylate de DL-lysine135mg (soit en acide salicylique 75 mg)

Liste de(s) excipient(s)

Lactose

Indications thérapeutiques

Ce médicament est une préparation magistrale à base d'acide acétylsalicylate de DL-lysine, remplaçant le Kardegic® 75mg, actuellement en rupture d'approvisionnement.

Cette préparation contient de l'**aspirine**. Elle permet d'agir sur les plaquettes présentes dans le sang et de fluidifier le sang. Elle est indiquée :

- Dans la prévention des récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CETTE PREPARATION ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Cette préparation ne doit pas être utilisée en cas :

- D'allergie à l'aspirine ou aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- D'antécédent d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- D'ulcère gastroduodénal,
- De risque hémorragique au niveau de l'estomac
- D'insuffisance hépatique sévère, d'insuffisance rénale sévère, d'insuffisance cardiaque sévère non contrôlée,
- En association avec le méthotrexate
- En association avec les anticoagulants oraux chez un patient ayant des antécédents d'ulcère gastroduodénal (majoration du risque hémorragique),
- A partir du 6^{ème} mois de grossesse.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis de votre médecin.

L'aspirine n'est pas un médicament anodin, l'administration d'aspirine n'est justifiée que dans certaines situations relevant de la prescription médicale. Il convient de prévenir votre médecin de la prise d'aspirine en cas de geste chirurgical même mineur en raison du risque de saignement.

Aux fortes doses utilisées en rhumatologie il est recommandé de surveiller l'apparition des signes de surdosage.

En cas d'apparition de bourdonnements d'oreilles, de baisse de l'acuité auditive, de maux de tête et de vertiges, consultez sans attendre votre médecin. Ces signes peuvent être ceux d'un surdosage.

La surveillance devra être renforcée en cas d'antécédent d'ulcère gastroduodénal, de gastrite, d'insuffisance rénale ou hépatique, d'asthme.

L'aspirine peut augmenter l'importance et la durée des règles.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

L'aspirine ne doit pas être associée avec :

- Le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,
- Les anticoagulants oraux chez les personnes ayant des antécédents d'ulcère,
- Avec d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

La consommation d'alcool pendant le traitement est déconseillée.

En cas de traitement simultané par un anticoagulant oral et de l'aspirine, aux doses maximales, une surveillance renforcée de l'anticoagulant sera nécessaire (INR).

Dans tous les cas, si vous prenez d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER CETTE PREPARATION ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau au milieu du repas.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.


4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, cette préparation est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : gastrite, douleurs abdominales, saignements du nez ou des gencives, hématomes.

Plus rarement, hémorragie du tube digestif, urticaire, œdème, asthme.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Préparation magistrale
remplaçant le
Kardegic 75 mg®

Date de création
23 mars 2022

Version 1

Page 2 sur 2

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CETTE PREPARATION ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois